



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

24.10.2019

№ 282

Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
14.11.2019 за № 579/3128

**Об утверждении Ветеринарно-санитарных
правил содержания медоносных пчел**

На основании подпункта 2.1.1 пункта 2.1, пункта 4.15 Положения о Государственной службе ветеринарной медицины Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 14.04.2015 № 02-04/95/15 (с изменениями), с целью обеспечения эпизоотического благополучия в Луганской Народной Республике, а также с целью определения требований к условиям содержания, мероприятиям по профилактике и борьбе с заболеваниями медоносных пчел и усовершенствования действующего законодательства Луганской Народной Республики в сфере ветеринарной медицины, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарно-санитарные правила содержания медоносных пчел.

2. Главному специалисту-юристу отдела правового обеспечения Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Жуковой А.А. обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Токарь А.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечению 10 (десять) дней после дня его официального опубликования.

Начальник

Н.В. Грабко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики
от «24» октября 2019 № 282

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
14.11.2019 за № 579/3128

Ветеринарно-санитарные правила содержания медоносных пчел

I. Общие положения

1.1. Ветеринарно-санитарные правила содержания медоносных пчел (далее – Правила) определяют требования к условиям содержания, мероприятиям по профилактике и борьбе с заболеваниями медоносных пчел (далее – пчел) в целях их воспроизводства, выращивания, реализации, использования для опыления энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства.

1.2. Настоящие Правила распространяются на пасеки всех форм собственности и являются обязательными для соблюдения физическими и юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями, занимающимися содержанием и разведением пчел.

1.3. По производственным направлениям пасеки различают:
медотоварные – предназначенные для получения продуктов пчеловодства;

опылительно-медовые – предназначенные для опыления энтомофильных растений и производства меда;

опылительные пасеки – предназначенные для опыления пчелами культур закрытого грунта;

репродукторные (питомники) – предназначенные для воспроизводства пчел (выведение пчеломаток, производства сотовых и бессотовых пакетов пчел и сбора маточного молочка);

племенные – предназначенные для размножения, улучшения и вывода пчел определенной породы, хранения генофонда пчел, вывода племенных пчеломаток, производства сотовых и бессотовых пакетов пчел и сбора маточного молочка;

карантинные – предназначенные для осуществления комплекса мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированных или подозреваемых в инфицировании пчелосемей.

1.4. В настоящих Правилах термины употребляются в следующих значениях:

бессотовый пакет пчел – пчелы с маткой и кормом в ящике без сотов, предназначенные для транспортирования;

весенняя ревизия – первый в сезоне тщательный осмотр всех пчелиных семей пасеки для определения результатов зимовки, создания необходимых условий для их развития и интенсивного наращивания пчел к главному медосбору;

вощина – восковой лист с тисненными донышками пчелиных или трутневых ячеек;

главный медосбор – интервал времени, в течение которого пчелы собирают наибольшее за сезон количество нектара;

дезакаризация – комплекс мер по уничтожению паразитирующих клещей;

дезинсекция – комплекс мер по уничтожению насекомых вредителей;

дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды;

дымарь – приспособление для образования дыма, умиряющего пчел при осмотре пчелиной семьи;

зимовник – помещение для зимовки пчелиных семей в ульях;

контрольный улей – улей с пчелиной семьей, установленный на весы, для определения количества принесенного или израсходованного пчелами корма;

леток – отверстие в передней стенке улья, предназначенное для входа и выхода пчел;

ульевая магазинная надставка – это полукорпус улья для складывания пчелами нектара;

медосбор – сбор и принос в улей нектара пчелами;

облет пчел – вылет пчел из улья для ориентирования и освобождения от экскрементов;

пасека – группа пчелиных семей в ульях с необходимыми для работы с ними постройками и принадлежностями на определенном земельном участке;

пчелиный клуб – пчелы, расположенные уплотненно в гнезде пчелиной семьи при пониженных температурах и в период зимовки;

расплод – совокупность яиц, личинок и куколок в ячейках сота;

роение – естественное размножение пчел путем отделения части семьи с маткой;

план размещения пасек (кочевая карта) – документ, в котором определяются места и сроки расположения пасек при вывозе пчел на медосбор и опыление энтомофильных растений;

пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчел, матки, трутней летом, гнезда с расплодом в активных период и корма;

пчелиный рой – группа пчел с пчелиной маткой, отделившаяся от основной семьи для образования новой семьи;

сот – совокупность пчелиных ячеек;

сотовый пакет пчел – пчелиная семья с сотами и расплодом, собранная в ящик для ее транспортирования;

улей – сооружение для содержания одной или нескольких пчелиных семей;

улочка пчел – масса пчел, полностью занимающих пространство между рядом размещенными сотами;

ульевая рамка – рамка для размещения вошины и отстройки сота пчелами;

энтомофильные растения – растения, которые опыляются насекомыми.

II. Требования к размещению и обустройству пасек

2.1. Пасеки размещают в благополучной по заразным болезням пчел местности, на сухих, освещенных солнцем, защищенных от ветров местах на расстоянии не ближе 500 м от шоссе и железных дорог, пиломатериалов, высоковольтных линий электропередач, не менее 1 км от животноводческих и птицеводческих строений и 5 км от воскоперерабатывающих заводов, предприятий кондитерской и химической промышленности, аэродромов,

военных полигонов, радиолокационных, радио- и телетрансляционных станций и других источников микроволнового излучения.

Расстояние от пасеки, предназначенной для медосбора и опыления, до репродуктивной и карантинной должно быть не менее 7 км.

2.2. Запрещается размещение пасек, а также ульев с пчелами, вывезенными на медосбор и опыление, на расстоянии ближе, чем 100 метров от детских, образовательных, медицинских и оздоровительных учреждений, учреждений культуры, мест массового скопления людей. Семьи пчел запрещается размещать: на балконах, чердаках, крышах и в подъездах многоквартирных жилых домов, на территории гаражных кооперативов.

2.3. В населенных пунктах осуществляется содержание миролюбивых пород пчел (башкирская, карпатская, серая горная кавказская, среднерусская и их породные типы).

2.4. При содержании пчел в населенных пунктах их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.

2.5. Ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к середине участка владельца или собственника пасеки, или без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее 2 метров.

2.6. Высота расположения ульев должна определяться в зависимости от характера местности, влажности, температуры и иных погодных и природных условий их расположения. Расстояния между ульями должны обеспечивать свободный доступ к каждой семье, в случае применения средств механизации необходимо обеспечить проезд этих средств, а также размещение павильонов.

Перед летками делают площадки размерами 0,5х0,5 м. Трупы пчел и мусор на этих площадках собирают и сжигают. Территория пасеки должна быть освобождена от растительности.

2.7. Пчел содержат в исправных ульях, окрашенных в разные цвета (синий, оранжевый, желтый и зеленый). На каждой пасеке должны быть резервные ульи и ульевые рамки (не менее 10% от общего количества). Пчелы могут содержаться в стационарных и передвижных павильонах (далее –

павильоны) с вмонтированными в них ульями-секциями, которые являются одновременно зимовником.

2.8. Ульи подлежат групповому маркированию, при проведении которого группой животных считают пчелосемью, обитающую в данном улье.

Для маркирования ульев осуществляется нанесение идентификационного номера на внешнюю стенку улья. При этом идентификационный номер улья считается идентификационным номером средства маркирования.

Идентификационный номер должен быть читаемым с расстояния не менее 5 метров.

Наряду с нанесением идентификационного номера средства маркирования, на улей по желанию владельца или собственника может наноситься идентификационный номер группы животных, каковой считают пчелосемью, обитающую в данном улье.

В случае использования улья со зрелищными целями допускается нанесение идентификационного номера в любом месте улья.

Маркирование осуществляется в срок не более 2 недель после заселения улья.

Идентификация и учет пчелосемей, образовавшихся на территории Луганской Народной Республики, проводится в срок не более 3 недель после образования пчелосемьи (роения).

Идентификация и учет пчелосемей, ввезенных на территорию Луганской Народной Республики, проводится в срок не более 3 недель после ввоза.

2.9. Все пасеки разной формы собственности подлежат учету по месту расположения в Государственном учреждении Луганской Народной Республики «Станция по борьбе с болезнями животных города (района)» (далее – ГУ ЛНР СББЖ города (района), где на их в обязательном порядке оформляется ветеринарно-санитарный паспорт пасеки согласно Порядку выдачи ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, утвержденному приказом Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной республики от 12.09.2019 № 223, зарегистрированному в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 23.09.2019 за № 499/3048.

2.10. ГУ ЛНР СББЖ города (района) на подконтрольной территории ведет план размещения пасек (карта). В котором указываются пасеки, которые имеют постоянный адрес расположения и пасеки прибывшие на медосбор и опыление с указанием периода их пребывания.

2.11. На территории пасеки должны размещаться ульи, зимовник, помещения или пасечные постройки для обработки продукции пчеловодства, хранения ульевых рамок, сот с медом и пергой, тары, пчеловодного инвентаря, а также дезинфицирующих средств.

При содержании пчел в павильонах обработка продукции пчеловодства, хранение пустых ульевых рамок, сот с медом и пергой, тары для размещения продукции пчеловодства, пчеловодного инвентаря, дезинфицирующих средств осуществляются в павильонах.

Пасеку оборудуют площадкой, на которой осуществляется дезинфекция ульев, ульевых рамок, тары, пчеловодного инвентаря, закрытую яму для сточных вод, туалетное помещение для пчеловода.

2.12. На пасеках должны быть аптечки для оказания первой медицинской помощи. Аптечка должна содержать противоаллергические (антигистаминные) препараты, средства для лечения анафилактического шока и краткую инструкцию по их применению.

III. Требования к условиям содержания пчел

3.1. При посещении пасеки, а также ульев с пчелами, вывезенными на медосбор и опыление, и обслуживании пчел необходимо использовать чистую продезинфицированную спецодежду и обувь.

3.2. Осмотр пчел следует проводить при благоприятных погодных условиях (тихие, теплые и солнечные дни) и с учетом наименьшего беспокойства для пчел.

3.3. В населенных пунктах запрещается применение технологических приемов и методов работы, вызывающих агрессивное поведение пчел. Все работы с пчелами необходимо проводить с применением дымара.

3.4. Ульи с пчелами из зимовника выносят при наружной температуре воздуха не ниже +5 °С либо при стойком повышении температуры в зимовнике до +6 °С, или с учетом беспокойства пчел при более низкой температуре (за исключением содержания пчел в павильонах).

3.5. В весенний период при температуре воздуха не ниже +12 °С проводится ревизия пчел, в ходе которой осматривают пчелосемьи, устанавливают их силу (количество пчел), определяют наличие и количество расплода. Пустые ульевые рамки, заплесневелые и (или) испачканные

испражнениями пчел, удаляют, ульевые рамки с расплодом и кормом очищаются. Пчелосемьи пересаживают в продезинфицированные ульи. Слабые пчелосемьи без явных признаков болезней пчел объединяют.

3.6. На специальной площадке проводят механическую очистку и дезинфекцию пчеловодного оборудования, инвентаря и свободных от корма пригодных к эксплуатации сотов. Пролеченные предметы размещают в соответствующих помещениях.

3.7. Во время главного медосбора запрещается:
проводить лечение пчел и откачивать мед из гнездовых рамок;
проводить объединение пчелосемей, имеющих явные признаки болезней пчел, с другими пчелосемьями;
использовать соты с расплодом, кормом пчелосемей, имеющих явные признаки болезни пчел, для других пчелосемей.

3.8. На пасеке, а также возле ульев с пчелами, вывезенными на медосбор и опыление, устанавливаются поилки с чистой и подсоленной водой (0,01 %-ный раствор поваренной соли).

3.9. Пчелиные гнезда расширяются светло-коричневыми сотами. Ежегодно должно обновляться не менее 30 % запасов сот.

3.10. После главного медосбора:
проводятся механическая очистка и дезинфекция пчеловодного инвентаря и пустых ульевых рамок;
перетапливаются на воск выбракованные соты, за исключением сот из ульевых рамок, находящихся в гнезде пчелосемьи;
осуществляются мероприятия, направленные на недопущение пчелиного воровства, роения и слета роев;
просушивается и очищается помещение зимовника, стены и потолок помещения зимовника должны быть побелены известью (за исключением содержания пчел в павильонах);
соты после откачки меда помещаются для сушки в улья, из которых они были ранее изъяты;
проводятся ревизия пчелосемей, выбраковка пчел, объединение пчелосемей в целях наращивания силы на зиму;
падевый мед заменяется на сахарный сироп.

3.11. Ежегодно в конце августа – начале сентября кормовые запасы на одну пчелосемью пополняются искусственным кормом (сахарный сироп – не менее 25 кг сахара, 2 кг цветочного меда или перги). Запрещается скармливание сахарного сиропа из общих кормушек.

3.12. Сборка пчелиных гнезд в зимний период осуществляется после пополнения кормовых запасов и выхода основной массы расплода. Освободившиеся от расплода маломедные (менее 1,5 кг меда) соты удаляются из пчелиного гнезда.

3.13. С наступлением устойчивой холодной и сухой погоды при температуре воздуха ниже +5 °С ульи с пчелами заносятся в зимовник (за исключением содержания пчел в павильонах), крышки с ульев снимаются, летки зарешечиваются.

3.14. По окончании медосбора и опыления пчеловоды очищают донышка ульев и территорию пасеки от травы, мусора и скоплений трупов пчел, которые собирают и сжигают.

IV. Требования при вывозе пчел на медосбор и опыление

4.1. На места медосбора и опыления пчелиные семьи доставляют всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, речным и воздушным) в соответствии с требованиями действующего законодательства Луганской Народной Республики и настоящих Правил.

4.2. К перевозке на места медосбора и опыления допускают здоровые пчелиные семьи из мест, благополучных по болезням пчел, при которых вводят карантин.

Вывоз пчелиных семей в пограничную зону глубиной до 15 км к государственной границе и из этой зоны вглубь страны запрещается.

4.3. Владелец или собственник пасеки определяет количество пчелиных семей, подлежащих вывозу, устанавливает в ГУ ЛНР СББЖ города (района) благополучие района по болезням пчел, и возможность вывоза на медосбор и опыление.

4.4. Пасеки, вывезенные на медосбор и опыление, размещают у источников древесных и кустарниковых нектароносов и пыльценосов на

расстоянии не менее 1,5 километров друг от друга и не менее 3 километров от пасеки, которая имеет постоянный адрес расположения.

4.5. Размещение пасек и ульев при вывозе пчел на медосбор и опыление должно осуществляться с учетом норм размещения пчелосемей на энтомофильных растениях согласно приложению к настоящим Правилам.

4.6. ГУ ЛНР СББЖ города (района) в установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке на перевозку пчелосемей, медосбор и опыление энтомофильных растений владельцу или собственнику пасеки выдает ветеринарные документы, подтверждающие благополучие пасек и мест их вывоза по заразным болезням пчел. При перевозке пчелосемей в другой район или город Луганской Народной Республики ветеринарные документы выдает ГУ ЛНР СББЖ города (района), по согласованию с соответствующим ГУ ЛНР СББЖ города (района), куда ввозятся пчелы для опыления и медосбора.

Вывоз пчелосемей за пределы Луганской Народной Республики осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Луганской Народной Республики.

4.7. Владелец или собственник пчелосемей определяет потребность в транспортных средствах для перевозки пчел, выделяет для их сопровождения пчеловодов и подсобных рабочих, обеспечивает их инвентарем, спецодеждой, кочевым домиком, а также инструктирует по соблюдению ветеринарно-зоотехнических правил и техники безопасности при уходе за пчелами на пути перевозки и на местах.

4.8. Перед вывозом на медосбор и опыление пчелосемьи подлежат на месте клиническому осмотру, профилактическим лечебным обработкам с одновременным лабораторным исследованием материала с пасек, а ульи – дезинфекции и дезакаризации. Эти работы должны быть завершены за 5 дней до отправления.

4.9. Результаты исследований и сведения об обработке пчелосемей специалисты ветеринарной медицины обязаны записать в ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

4.10. Перевозку пчел следует проводить в закрытых скрепленных ульях.

4.11. В случаях возникновения задержки при осуществлении перевозки пчел на срок более одного часа для предотвращения гибели пчел от перегрева и резкого повышения влажности воздуха ульи перемещаются из транспортного средства в проветриваемое место для временного расположения.

4.12. По прибытии в район медосбора и опыления энтомофильных растений владелец или собственник пасеки обязан в течение трех суток предъявить в ГУ ЛНР СББЖ города (района) ветеринарный документ и ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

4.13. Специалисты ветеринарной медицины ГУ ЛНР СББЖ города (района), проверив документы прибывшей пасеки, регистрируют ее в журнале учета пасек, подвергают 2-3% пчелосемей осмотра и делают соответствующие записи в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки. При вывозе пчелиных семей по окончании медосбора и опыления за пределы района (города) их осматривают и выдают ветеринарный документ.

4.14. В случае выявления заболевания или гибели пчелиных семей на пасеке, вывезенной на медосбор и опыление, специалисты ветеринарной медицины ГУ ЛНР СББЖ города (района) принимают меры в соответствии с настоящими Правилами.

V. Мероприятия по охране пасек от заноса возбудителей заразных болезней пчел

5.1. Пасеку комплектуют только клинически здоровыми пчелиными семьями собственного воспроизводства, а также семьями, поступившими из благополучных по заразным болезням пасек, при наличии ветеринарных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие территорий и мест производства (происхождения) пчел по заразным болезням пчел, оформленных в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

5.2. Пчелы, содержащиеся на пасеках различных форм собственности, подлежат диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней пчел в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

5.3. Пчелиные сотовые и бессотовые пакеты и матки из зарубежных стран отбирают, формируют и пересылают в соответствии с требованиями действующего законодательства Луганской Народной Республики.

5.4. Завозимые пчелы, а также рои неизвестного происхождения размещают на карантинной пасеке не менее 7 км от других пасек. Период карантина составляет 30 дней. В период карантинирования проводится клинический осмотр пчел, диагностические исследования и обработки.

5.5. Реализацию семей пчел, сотовых и бессотовых пакетов, маток с пасек, продуктов пчеловодства осуществляют только после тщательного их осмотра специалистом ветеринарной медицины ГУ ЛНР СББЖ города (района) и выдачи ветеринарного документа с учетом записей в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки.

5.6. Ульи, ульевые рамки, пчеловодный инвентарь, спецодежду и обувь, тару для размещения продукции пчеловодства запрещается передавать с одной пасеки на другую без предварительной дезинфекции.

5.7. О заболевании или гибели пчелиных семей владелец или собственник пасеки независимо от ее формы собственности обязан немедленно сообщить в ГУ ЛНР СББЖ города (района).

5.8. После получения сообщения о заболевании или гибели пчелиных семей руководитель ГУ ЛНР СББЖ города (района) организует проведение эпизоотологического обследования для установления причины возникновения заболевания и определения возбудителя болезни.

5.9. При подтверждении заразного заболевания или отравления руководитель ГУ ЛНР СББЖ города (района) обязан:

немедленно сообщить в Службу и прекратить перемещение и реализацию пчел, маток, продуктов пчеловодства и предметов ухода за пчелами;

оформить и предоставить материалы об объявлении пасеки неблагополучной по заразным заболеваниям или отравлениям, установлению карантина или ограничений, а также план комплексных мероприятий по ликвидации заболеваний для рассмотрения на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Администрации города (района).

5.9.1. При установлении особо опасных болезней (акарапидоз; американский гнилец; европейский гнилец, вызванный возбудителем *M.pluton*), а также отсутствующих на территории страны экзотических заболеваний (порошковидный расплод, тропилелапсоз) на пасеке и территории вокруг нее в радиусе 7 км вводят карантин согласно настоящим Правилам.

5.9.2. При обнаружении болезней пчел, возбудители которых могут представлять определенную угрозу для здоровья человека (аспергиллез, сальмонеллез, гафниоз, колибактериоз, цитробактериоз, шигеллезы, протеоз, клебсиеллез), а также мешотчатого расплода, хронического и острого паралича, филаментовируса, болезни деформации крыла (египтовироз), аскосфероза, нозематоза, парагнильца, европейского гнильца (при других возбудителях, кроме *M.pluton*), псевдомоноза (септицемии), варроатоза, браулеза – на пасеку накладывают ограничения согласно настоящим Правилам.

5.9.3. Об обнаружении заразных болезней пчел немедленно оповещают владельцев или собственников всех пасек, расположенных в данном административно-территориальной единице Луганской Народной Республики, и ГУ ЛНР СББЖ города (района) соседних административно-территориальных единиц Луганской Народной Республики.

Одновременно организуют проведение эпизоотологического обследования этих пасек, пчел, маток, продуктов пчеловодства и предметов ухода за пчёлами.

5.10. При подтверждении особо опасных болезней (акарапидоз; американский гнилец; порошковидный расплод; тропилелапсоз; европейский гнилец, вызванный возбудителем *M.pluton*) согласно требованиям и условиям карантина запрещается:

вывоз (ввоз) из пасек в другие пасеки пчелиных семей (сотовых и бессотовых пакетов), маток, а также продуктов пчеловодства и предметов ухода, предусмотренных для использования на пасеках;

доступ на территорию неблагополучной пасеки посторонним лицам;

вывоз пчел неблагополучной пасеки в исключительных случаях разрешают на специально отведенные места, удаленные от благополучных пасек на расстояние не менее 7 км, с соблюдением мер, предотвращающих вылет пчел при транспортировке, и обязательным проведением заключительной дезинфекции мест стоянок ульев после их вывоза из точки.

5.11. При карантине или ограничении на неблагополучной пасеке проводят ветеринарно-санитарные мероприятия, в частности:

непригодные соты выбраковывают и перерабатывают на воск;

пригодные соты, которые использовались на пасеке для получения расплода не больше 2-3 лет, а также магазинные (полурамки) соты обеззараживают в соответствии с требованиями Инструкции по дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и дератизации на пасеках, утвержденной Главным управлением ветеринарии Государственного агропромышленного комитета СССР от 10.05.1990 № 044-3, применяемых на основании части 2 статьи 86 Конституции Луганской Народной Республики (далее – Инструкция по дезинфекции);

воск из неблагополучной пасеки обязательно маркируют (указывают первые буквы болезни, например АГ – американский гнилец, ЕГ – европейский гнилец, АС – аскосфероз и т.д.) и при его переработке подвергают обязательному обеззараживанию в соответствии с настоящими Правилами;

мед от погибших пчелиных семей запрещается использовать для подкормки пчел и как пищевой продукт для людей;

передлетковые площадки, ульи, рамки, инвентарь, спецодежду – дезинфицируют;

применяют противороевые мероприятия, запрещается скармливание сахарного сиропа из общей кормушки и выставка ульевых рамок с целью их просушки после откачки меда;

соты (после откачки меда) возвращают в ульи, с которых они были отобраны;

не допускают содержание слабых и безматочных семей.

5.12. Больные пчелиные семьи подвергают лечению препаратами и способами, не противоречащими требованиям действующего законодательства Луганской Народной Республики.

Осуществляют перегон пчел – переселение больных пчелиных семей в новые или продезинфицированные ульи с последующей подкормкой их лечебным сиропом.

5.13. Для правильного подбора лекарственных препаратов и более эффективного лечения больных пчел в лаборатории ветеринарной медицины определяют чувствительность выделенных штаммов возбудителей заразных болезней к соответствующим лекарственным средствам.

5.14. Основанием для объявления пасеки благополучной по заразным болезням пчел и снятия карантина или ограничений служат отсутствие заболевания пчелиных семей в течение периода, указанного при соответствующих болезнях, и отрицательные результаты лабораторного исследования.

Наложение и снятие карантина или ограничений фиксируются в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки.

5.15. Перед снятием карантина или ограничений с неблагополучной пасеки владельцам или собственникам пасек необходимо обеспечить тщательную очистку и дезинфекцию освобожденных от больных семей ульев, ульевых рамок, а также пчеловодного инвентаря и оборудования, помещений, предлетковых площадок в порядке, предусмотренном Инструкцией по дезинфекции.

При отсутствии признаков болезней и выполнении вышеупомянутых мероприятий до указанного срока снятия карантина возможен завоз здоровых семей пчел из-за пределов карантинной зоны.

5.16. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Администрации города (района), по представлению начальника ГУ ЛНР СББЖ города (района), принимает решение о наложении (снятии) карантина или ограничений с пасеки.

VI. Заключительные положения

6.1. Обжалование действий должностных лиц Службы и ГУ ЛНР СББЖ города (района) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

6.2. Ответственность за нарушение данных Правил наступает в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Начальник
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики

Н. В. Грабко

Приложение к
Ветеринарно-санитарным правилам
содержания медоносных пчел

Нормы размещения пчелосемей на энтомофильных растениях

Название	Средняя нектаропродуктивность, кг	Требуется пчелосемей на 1 га	
		для нектара и пыльцы	для опыления
Полевые культуры			
Подсолнечник	30-60	1	1
Гречиха	80-100	1-1,5	2
Рапс	60-100	1-2	1-2
Горчица	50-100	1-2	0,5-1
Кориандр	100-150	2-3	2-3
Бахчевые	10-30	0,5	0,5-1
Люцерна без полива	25-50	1-2	10-12
Люцерна поливная	200-300	4-6	10-12
Эспарцет	70-120	2-3	3-4
Фацелия	100-350	2-7	2-7
Донник	200-500	4-8	-
Клевер красный	10-25	1	4-6
Хлопчатник	-	-	5-6
Древесно-кустарниковые			
Акация белая	300-600	6-10	-
Акация желтая	50-150	1-3	-
Клен остролистный	150-200	3-4	-
Малина лесная	100-200	2-4	2
Плодовые	20-40	1-2	2-3
Ягодники	50-100	1-2	2-3
Смородина, крыжовник	-	-	4
Лесное и луговое разнотравье			
Кипрей	500-1000	8-16	-
Вереск	100-150	2-3	-
Клевер белый	75-100	2-3	-
Клевер розовый	100-130	2-3	-